

ANTIGRAM® gold

Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo, spinacio e bietola da foglia e da costa.

Concentrato emulsionabile.

S-metolachlor – codice HRAC-WSSA 15;K3

Composizione

100 g di prodotto contengono:

S-metolachlor puro g 86,5 (960 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

Contiene S-metolachlor



ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

lavare abbondantemente con acqua e sapone

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basilea (Svizzera) –

Tel. 02-33444.1

Distribuito da: ADAMA Italia s.r.l. – Tel. 035-328811

Stabilimenti di produzione:

Chemark ZRT. Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives (Francia)

Syngenta Chemical B.V., Seneffe (Belgio)

Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

ADAMA Agriculture España S.A. – Madrind (Spagna)

ADAMA Manufacturing Poland S.A. – Brzeg Dolny (Polonia)

Torre S.r.l., Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di rietichettatura:

Anriv S.r.l., Ferrara

Sinteco Logistics S.p.a., San Giuliano Milanese (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 13455 del 02.10.2006

Taglie: litri 1- 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 – 20

Partita n. Vedi corpo della confezione

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. **“Avvertenza” Consultare un Centro Antiveneni.**

Caratteristiche di azione

Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

Erbe infestanti sensibili

Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Setaria (*Setaria* spp.), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Veronica comune (*Veronica* spp.).

Erbe infestanti mediamente sensibili

Loglio (*Lolium* spp.), Avena selvatica (*Avena* spp.), Farinello (*Chenopodium album*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

Epoca di impiego

Pre-emergenza.

Mais: anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purchè non siano nate le erbe infestanti.

Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.

Spinacio e bietola da foglia e da costa: impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto.

Dosi di applicazione

Mais: 1,25-1,5 litri/ha

Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha

Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha

Pomodoro: 1-1,5 litri/ha

Fagiolo: 1 litro/ha

Spinacio e bietola da foglia e da costa: 0,5 litri/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.

Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.

Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento

Da non vendersi sfuso

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8.10.2019 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24/4/2023

syngenta.